



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 20/2569

สภาวะอากาศ

ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม เป็นช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวนี้ ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในช่วงแรก จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้บางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นเป็นระยะๆ โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง บางช่วง คลื่นสูง 2-3 เมตร

คำเตือน

ในระยะนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีโอกาสที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณปลายแหลมญวนเข้าใกล้ประเทศไทยได้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว จึงขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกษตร

ประเทศไทย ประเทศไทยมีฝนฝนตกหนาแน่นเป็นระยะๆ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่งผลให้สภาพอากาศและดินที่มีความชื้นสูง และสลับกับฝนตกหนัก เสี่ยงต่อการเกิดโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย และปัญหาน้ำท่วมขังในแปลงเกษตร


พืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก : พืชไร่และข้าวเป็นระยะเก็บเกี่ยว ความชื้นในอากาศและฝนที่ลดลงจะส่งผลดีต่อการเก็บเกี่ยว แต่เกษตรกรควรรีบตากและเก็บรักษาผลผลิตในที่ร่มมิดชิดเพื่อป้องกันความเสียหายจากฝนหลงฤดู ส่วนไม้ผล ในสภาพอากาศที่เริ่มเย็นและแห้งลงจะช่วยกระตุ้นการสะสมอาหารเพื่อการติดดอกออกผล แต่ข้อควรระวัง สภาพอากาศที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำและความร้อนสะสมช่วงกลางวัน อาจทำให้เกิดการระบาดของ เพลี้ยไฟและไรแดง ที่มักเข้าทำลายยอดอ่อนและข้อผล เกษตรกรควรรักษาความชื้นในแปลงปลูกอย่างเหมาะสม ขณะภาคใต้ฝนที่ตกหนักสะสมและความชื้นสูงและมีน้ำท่วมขัง อาจส่งผลให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora) และโรคใบติดในไม้ผล เกษตรกรควรขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำขังโคนต้น

สัตว์เลี้ยง : ในช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนจะมีความแตกต่างกันสูง (กลางวันร้อน กลางคืน/เช้าเย็น) ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันและเกิดความเครียด เกษตรกรควรดูแลความสะอาดของโรงเรือน ควบคุมลมโกรก และเสริมวิตามินละลายน้ำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน


สัตว์น้ำ : ฝนที่ตกหนักไหลลงโนบ่อเลี้ยง (โดยเฉพาะภาคใต้ และฝนหลงฤดูในภาคกลาง) จะทำให้ค่า pH และอุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนและหมุนเวียนชั้นน้ำ รวมทั้งปรับลดปริมาณการให้อาหารลง เพื่อป้องกันอาหารเหลือตกค้างทำให้น้ำเน่าเสีย

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรติดตามประกาศพยากรณ์อากาศรายวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูอาจมีการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศเย็นและทิศทางลมได้ตลอดเวลา

คาดหมายปริมาณฝนสะสม ระหว่างวันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2569



ปริมาณฝนสะสม(มม.)



ปริมาณฝน(มม.) ที่ต่างจากค่าปกติ

หมายเหตุ : ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ย คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)
